

# *Részletes takarmányozástan gyakorlat*

*A brojlercsirke gyakorlati takarmányozása*

## **Takarmányozási rendszer**

### **Fázisos takarmányozás:**

- a növekedés intenzitásának megfelelő takarmánykeverékek etetése
- Brojlercsirke (42 nap; 2,0-2,2 kg vágósúly; 1,8-2,2 kg/kg tak. ért.)
  - indító keverék: 1-10. nap
  - nevelő keverék : 11-28. nap
  - befejező keverék : 29-42. nap
- Pecsényekacsa (49 nap; 3,0-3,5 kg vágósúly; 3 kg/kg tak. ért.)
- Pecsényeliba (56 nap; 4,0-4,5 kg vágósúly; 3 kg/kg tak. ért.)



# Brojlercsirke gyakorlati takarmányozása

## Mintapéldák

Indító	1-10. nap	Nevelő	11-28. nap	Befejező	29-42. nap
Összesen	0,8 kg/állat	Összesen	2 kg/állat	Összesen	1 kg/állat
<i>Abrakhányad összesen</i>	95-96%	<i>Abrakhányad összesen</i>	95-96%	<i>Abrakhányad összesen</i>	95-96%
Kukorica	40-60%	Kukorica	40-60%	Kukorica	40-60%
Búza	Max. 20%	Búza	Max. 20%	Búza	Max. 20%
<i>Extrahált darúk</i>	20-30%	<i>Extrahált darúk</i>	20-30%	<i>Extrahált darúk</i>	20-30%
Extr. szója	20-25%	Extr. szója	20-25%	Extr. szója	20-25%
Extr. nf.	-	Extr. nf.	4-5%	Extr. nf.	4-5%
Extr. repce	-	Extr. repce	4-5%	Extr. repce	4-5%
<i>Tak. élesztő</i>	1-2%	<i>Tak. élesztő</i>	1-2%	<i>Tak. élesztő</i>	1-2%
<i>Halliszt</i>	4-6%	<i>Halliszt</i>	4%	<i>Halliszt</i>	-
Zsírpor/növényi olaj	Max. 6%	Zsírpor/növényi olaj	Max. 6%	Zsírpor/növényi olaj	Max. 6%
Kiegészítők	4-5%	Kiegészítők	4-5%	Kiegészítők	4-5%
Biometin		Biometin		Biometin	
Biolizin		Biolizin		Biolizin	
API7		API7		API7	
Takarmánymész		Takarmánymész		Takarmánymész	
Takarmánysó	0,2%	Takarmánysó	0,2%	Takarmánysó	0,3%
Egységes prémix	0,5 %	Egységes prémix	0,5 %	Egységes prémix	0,5 %